

# Hepatitida B

## Vznik nemoci:

- snížená obranyschopnost vlivem užívání drog
- přítomnost viru hepatitidy B (HBV)
- inkubační doba 1 - 6 týdnů

## Jak se nemoc přenáší:

- sex s nakaženým člověkem
- sdílení injekčních stříkaček a jehel s někým, kdo je nakažený
- používání kartáčku na zuby a holení od člověka, který je nakažený
- z nakažené matky na nenarozené dítě
- kontakt s krví, spermatem, poševním sekretem a slinami nakaženého
- tetování

## Co je to za nemoc:

- infekční a zánětlivé onemocnění jater

## Jak nemoc vypadá:

- někdy bez příznaků (nic tě nebolí)
- bolest hlavy - bolest svalů
- ztráta chuti k jídlu
- špatně od žaludku
- zvracení
- tmavá moč a světlá stolice
- bledá pokožka
- může se objevit zezloutnutí (pokožka a oční bělmo)

hepka • žloutenka • běčko

[www.xtp.cz](http://www.xtp.cz)

externí terénní program

tel.: 608 714 477

[info@xtp.cz](mailto:info@xtp.cz)

## Nebezpečí a rizika nemoci:

- po 2 - 3 týdnech se můžete cítit v pořádku a po nějaké době se hepatitida může objevit prudší a vážnější
- může přejít do chronicity (nedá se vyléčit)
- cirhóza jater
- rakovina jater
- zničení imunitního systému
- ohrožení života (selhání jater)

## Jak nemoci a komplikacím předejít:

- dodržuj osobní hygienu
- nesdílej zubní kartáček a holení
- při sexu vždy používej kondom
- používej pouze a vždy sterilní injekční náčiní
- nepřijít do styku s krví, slinami, spermatem nebo poševním sekretem nakaženého
- každý člověk který má chronickou hepatitidu "B" je stále infekční (může tě nakazit)
- nikdy nesdílej s nikým jehly stříkačky, tampóny, vodu ani lžíci
- používej své vlastní nástroje
- používej kondom
- pozoruješ-li příznaky, které jsou uvedeny výše, vyhledej okamžitě lékaře - infekční oddělení
- po prodělání hepatitidy "B", bys neměl brát drogy, jinak se vystavuješ riziku - selhání jater a následné smrti

## Vznik nemoci:

- snížená obranyschopnost vlivem užívání drog
- přítomnost viru hepatitidy B (HBV)
- inkubační doba 1 - 6 týdnů

## Jak se nemoc přenáší:

- sex s nakaženým člověkem
- sdílení injekčních stříkaček a jehel s někým, kdo je nakažený
- používání kartáčku na zuby a holení od člověka, který je nakažený
- z nakažené matky na nenarozené dítě
- kontakt s krví, spermatem, poševním sekretem a slinami nakaženého
- tetování

## Co je to za nemoc:

- infekční a zánětlivé onemocnění jater

## Jak nemoc vypadá:

- někdy bez příznaků (nic tě nebolí)
- bolest hlavy - bolest svalů
- ztráta chuti k jídlu
- špatně od žaludku
- zvracení
- tmavá moč a světlá stolice
- bledá pokožka
- může se objevit zezloutnutí (pokožka a oční bělmo)

hepka • žloutenka • běčko

[www.xtp.cz](http://www.xtp.cz)

externí terénní program

tel.: 608 714 477

[info@xtp.cz](mailto:info@xtp.cz)

## Nebezpečí a rizika nemoci:

- po 2 - 3 týdnech se můžete cítit v pořádku a po nějaké době se hepatitida může objevit prudší a vážnější
- může přejít do chronicity (nedá se vyléčit)
- cirhóza jater
- rakovina jater
- zničení imunitního systému
- ohrožení života (selhání jater)

## Jak nemoci a komplikacím předejít:

- dodržuj osobní hygienu
- nesdílej zubní kartáček a holení
- při sexu vždy používej kondom
- používej pouze a vždy sterilní injekční náčiní
- nepřijít do styku s krví, slinami, spermatem nebo poševním sekretem nakaženého
- každý člověk který má chronickou hepatitidu "B" je stále infekční (může tě nakazit)
- nikdy nesdílej s nikým jehly stříkačky, tampóny, vodu ani lžíci
- používej své vlastní nástroje
- používej kondom
- pozoruješ-li příznaky, které jsou uvedeny výše, vyhledej okamžitě lékaře - infekční oddělení
- po prodělání hepatitidy "B", bys neměl brát drogy, jinak se vystavuješ riziku - selhání jater a následné smrti